

**କୃଷି ସୁଚନା ସେବା (ଧାନ)**  
**କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ, କଟକ**

**୨୦୧୫ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ର :**

❖ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ଧାନ ଗଛ ରୋଇବାର ୬୦ ଦିନ ପରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ(ସ୍ଫୁରିଆ ସାର ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ପିଛା ୫୨ କି.ଗ୍ରା.) ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ସେହିପରି ଶଙ୍କର କିସମ ଧାନରେ ରୋଇବାର ୬୦ ଦିନ ପରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଏବଂ ପଟାସ ସାର ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ(ହେକ୍ଟର ପିଛା ୬୫ କି.ଗ୍ରା. ସ୍ଫୁରିଆ ଏବଂ ୨୫ କି.ଗ୍ରା. ମ୍ୟୁରେଟ୍ ଅଫ୍ ପଟାସ) ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

❖ ଯେଉଁଠାରେ ବାଦାମାଗୁଣ୍ଡି ଯୋକ, ଧଳାପତ୍ରୁଡ଼ିଆଁ ଯୋକ ଏବଂ ପତ୍ରମୋଡ଼ା ଯୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଅଧିକ ଥାଏ ସେହିଠାରେ ଏହିସବୁ ଯୋକର ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ । ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଦେହଳା ସାମା ରେଖା ହେଲା

- ପତ୍ରମୋଡ଼ା ଯୋକ - ପ୍ରତି ବୁଦାରେ ୧ ରୁ ୨ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ପତ୍ର
- ବାଦାମାଗୁଣ୍ଡି ଯୋକ - ପ୍ରତି ବୁଦାରେ ୫-୧୦ ଯୋକ
- ଧଳା ପତ୍ରୁଡ଼ିଆଁ ଯୋକ - ପ୍ରତି ବୁଦାରେ ୫-୧୦ ଯୋକ

ଯୋକସଂଖ୍ୟା ଉପରୋକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ଦେହଳା ସାମାରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯୋକମରା ଔଷଧ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୫୦୦ ଲିଟର ପାଣି ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ପତ୍ରମୋଡ଼ା ଯୋକ-

ଗ୍ରାମ୍ଭାଜୋଫସ୍ ୪୦ E.C @ ୬୨୫ ମି.ଲି./ହେକ୍ଟର  
ଥାୟାମେଥୋକ୍ସାମ୍ ୨୫ W.G ୧୦୦ ଗ୍ରା./ହେକ୍ଟର କିମ୍ବା  
ନିମତେଲ @ ୫ ମି.ଲି./ଲିଟର ପାଣିରେ ଶତକଡ଼ା ୨ ଭାଗ ସାବୁନ ପାଣି ମିଶାଇ  
ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାର

ବାଦାମା ଗୁଣ୍ଡି ଯୋକ/ଧଳା ପତ୍ରୁଡ଼ିଆଁ ଯୋକ-

ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ ୧୭.୮ S.L @ ୧୨୫ ମି.ଲି./ହେକ୍ଟର  
ଥାୟାମେଥୋକ୍ସାମ୍ ୨୫ W.G @ ୧୦୦ ଗ୍ରା./ହେକ୍ଟର  
ଇଥୋଫେନୋପ୍ରୋକ୍ସ ୧୦ E.C @ ୫୦୦ ମି.ଲି./ହେକ୍ଟର  
ନିମତେଲ @ ୫ ମି.ଲି./ଲିଟର ପାଣି ଶତକଡ଼ା ୨ ଭାଗ ସାବୁନ ପାଣି ମିଶାଇ  
ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ୍ ।

ବି.ଦ୍ର.: ବାଦାମା ଗୁଣ୍ଡି ଯୋକ/ଧଳା ପତ୍ରୁଡ଼ିଆଁ ଯୋକର ସର୍ବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଧାନ ଗଛର ମୂଳକୁ ଗୋଟିଏ ଠେଙ୍ଗା ଦ୍ୱାରା ବାଡେଇ ଦେଲେ ଯୋକଗୁଡ଼ିକ ପାଣିକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବେ । ସେଥିରୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବା ଆର୍ଥିକ ଦେହଳା ସାମା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ।

\*\*\*\*\*