

କୃଷି ସୁଚନା ସେବା (ଧାନ)
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ, କଟକ

୨୦୧୫ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ର :

- ❖ ବର୍ଷାଗ୍ରିତ ସଙ୍କଳ୍ପାଳୁଆ ଜମି ଯେଉଁଠାରେ ସିଧାବୁଣା ହୋଇଥିବ ସେଠାରେ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର (୩୫ କି.ଗ୍ରା. ସ୍ଫୁରିଆ/ହେକ୍ଟର) ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
 - ❖ ରୁଆ ଧାନରେ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ଥୋଡ଼ ସାର ହିସାବରେ ରୋଇବାର ୪୦-୪୫ ଦିନ ପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ (ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ଧାନ ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୬୦ କି.ଗ୍ରା. ସ୍ଫୁରିଆ ଏବଂ ଶଙ୍କର କିସମ ଧାନ ପାଇଁ ୭୦ କି.ଗ୍ରା. ସ୍ଫୁରିଆ)
 - ❖ ତେରିରେ ରୁଆଯାଇଥିବା ଧାନରେ ଲେଡାପୋକ ଏବଂ ନଳୀ ପୋକର ପ୍ରାଦୂର୍ଭାବ ଅଧିକ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ୨୦ EC ୩ ମି.ଲି./ଲିଟର ପାଣି କିମ୍ବା ଟ୍ରାଇଜୋଫସ୍ ୨.୫ ମି.ଲି./ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ଏକ ହେକ୍ଟର ପାଇଁ ୫୦୦ ଲିଟର ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ।
 - ❖ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ, ପତ୍ରମୋଡା ପୋକ, ବାଦାମୀ ଗୁଣ୍ଡିପୋକ ଏବଂ ଧଳା ପତ୍ରଡିଆଁ ପୋକର ଆର୍ବିଭାବ ହୋଇପାରେ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଦେହଳୀ ସାମା ହେଲା ।
 - କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ- ୧-୨ ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଜାପତି କିମ୍ବା ବର୍ଗମିଟର ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡାପୁଞ୍ଜ
 - ପତ୍ରମୋଡା ପୋକ- ବୁଦାପ୍ରତି ୧-୨ ଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ପତ୍ର
 - ବାଦାମୀ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ- ବୁଦାପ୍ରତି ୫-୧୦ ଟି ପୋକ
 - ଧଳା ପତ୍ରଡିଆଁ ପୋକ- ବୁଦାପ୍ରତି ୫-୧୦ ଟି ପୋକ
- (ବି.ଦ୍ର: ବାଦାମୀ ଗୁଣ୍ଡିପୋକ ଏବଂ ଧଳା ପତ୍ରଡିଆଁ ପୋକର ଆର୍ବିଭାବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଧାନ ଗଛର ମୂଳକୁ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ି ଦ୍ଵାରା ବାଡେଇ ଦେଲେ ପୋକଗୁଡ଼ିକ ତଳେଥିବା ପାଣିକୁ ଡେଇଁପଡ଼ିବେ । ସେଥିରୁ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିହେବ)
- ❖ ଆର୍ଥିକ ଦେହଳୀ ସାମାରୁ ପୋକର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିଲେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପୋକମରା ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
 - ❖ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକର ଦମନ ପାଇଁ ରାଇନାକ୍ସିପାର ୨୦ SC ହେକ୍ଟର ପିଛା ୧୫୦ ମି.ଲି. କିମ୍ବା ଟ୍ରାଇଜୋଫସ୍ ୪୦ EC ହେକ୍ଟର ପିଛା ୧୨୫୦ ମି.ଲି. କିମ୍ବା ହେକ୍ଟର ପିଛା ୭୫୦ ଗ୍ରାମ୍ ଏସିଫେଟ୍ ୭୫ SP କିମ୍ବା କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ୨୦EC ହେକ୍ଟର ପିଛା ୨୫୦୦ ମି.ଲି. ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

- ❖ ପତ୍ରମୋଡା ପୋକ ଦମନ ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୬୨୫ ମି.ଲି. ଗ୍ରାଉଜୋଫସ୍ ୪୦ EC କିମ୍ବା ୧୦୦ ଗ୍ରା./ହେକ୍ଟର ଥାୟୋମିଥୋକ୍ସାମ୍ ୨୫ WG କିମ୍ବା ୫ ମି.ଲି. ନିମ୍ନତେଲ ସହିତ ଶତକଡା ୨ ଭାଗ ସାବୁନ ପାଣି ଏକ ଲିଟର ପାଣି ହିସାବରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ବାଦାମୀ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ/ଧଳା ପତ୍ରଡିଆଁ ପୋକ ଦମନ ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପିଛା ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ ୧୭.୮ SL ୧୨୫ ମି.ଲି. କିମ୍ବା ୧୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ଥାୟୋମିଥୋକ୍ସାମ୍ ୨୫ WG କିମ୍ବା ୫୦୦ ମି.ଲି. ଇଥୋଫେନ୍-ପ୍ରକ୍ସ ୧୦ EC କିମ୍ବା ୫ ମି.ଲି. ନିମ୍ନତେଲ ସହିତ ଶତକଡା ୨ ଭାଗ ସାବୁନ ପାଣିକୁ ଏକ ଲିଟର ପାଣି ହିସାବରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଯଥା ମହିଷା, ପତ୍ରାଛାଦ ପୋଡା, ପତ୍ରପୋଡା, ପତ୍ରଗାର ପୋଡା ଏବଂ ପତ୍ରାଛାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ରୋଗ ପାଇଁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦରକାର ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦମନ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ପତ୍ରପୋଡା/ପତ୍ରଗାର ପୋଡା ରୋଗ ଦମନ ପାଇଁ ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧ ଗ୍ରାମ୍ ହିସାବରେ ପ୍ଲୁକ୍ସୋମାଇସିନ୍ କିମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରେପ୍ଟୋସାଇକ୍ଲିନ୍ ୧୫୦ ମି.ଗ୍ରା. ସହିତ କପର ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ୧ ଗ୍ରାମ୍/ଲିଟର ପାଣି ମିଶାଇ ୮ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଦୁଇଥର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ମହିଷା ରୋଗ : ଏହାକୁ ଦମନ ପାଇଁ ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ଗ୍ରାମ୍ ହିସାବରେ କାରବେନ୍ ଡାଜିମ୍ ୫୦ WP କିମ୍ବା ୦.୬ ଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରାଉସାଇକ୍ଲୋଜୋଲ୍ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଦରକାର । ଏତଦ୍ୱ୍ୟତୀତ ବେଲପତ୍ର ରସ କିମ୍ବା ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରସ ୨୫ ଗ୍ରାମ୍ ପତ୍ର/ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କଲେ ଏହି ରୋଗ ଦମନ ହୋଇଥାଏ ।
- ❖ ପତ୍ରାଛାଦ ପୋଡା ରୋଗ ଦମନ ପାଇଁ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମି.ଲି. ହିସାବରେ ସିଥ୍ ମାର୍ ୩୮ L(ଭାଲିଡାମାଇସିନ୍ ୩୮L) କିମ୍ବା କଣ୍ଟାପ୍ ୫ EC ହେକ୍ଟୋକୋନାଜଲ ୫EC) ୨ ମି.ଲି./ଲିଟର କିମ୍ବା ବାଭିଷିନ୍ (କାରବେନ୍-ଡାଜିମ୍ ୫୦ WP) ୨.୫ ଗ୍ରାମ୍/ଲିଟର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ପତ୍ରାଛାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ରୋଗ ଦମନ ପାଇଁ କାରବେନ୍-ଡାଜିମ୍ ୫୦ WP (ବାଭିଷିନ୍ ୨ ଗ୍ରାମ୍ / ଲିଟର ପାଣି) କିମ୍ବା ପ୍ରୋପିକୋନାଜଲ (ଟିଲର୍ ୨୫ EC) ୧ ମି.ଲି./ଲିଟର ପାଣି କିମ୍ବା କଣ୍ଟାପ୍ ୫ EC(ହେକ୍ଟୋକୋନାଜଲ ୫ EC) ୧ ମି.ଲି./ଲିଟର ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ସାଆଁରା ରୋଗ ଦମନ ପାଇଁ ୦.୨୫% କାରବାନାଡିଜିମ୍ କିମ୍ବା ୦.୨୫% କାଟାଫଲ୍ କିମ୍ବା ୦.୪% ମାନକୋଜେଭ୍ ୭ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଥୋଡ ବାହାରିବା ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏଥିସହିତ ଦାନା ହୋଇସାରିବା ପରେ ଜମିରୁ ପାଣି କାଟିଦେବା ଦରକାର
- ❖ ସର୍ବଦା ମନେରଖିବା ଉଚିତ୍ ଯେ ପାଗ ପରିଷ୍କାର ଥିବା ସମୟରେ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ।
- ❖ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୨୦୧୫ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ୧ ତାରିଖରୁ ଧାନର ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟାଲ୍ ପିଛା ସାଧାରଣ ଧାନ ପାଇଁ (FAQ) ୧୪୧୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ କ ବିଭାଗର ଧାନ ପାଇଁ ୧୪୫୦ ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି
