

**କୃଷି ସୁଚନା ସେବା (ଧାନ)**  
**କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ, କଟକ**

**୨୦୧୭ ମସିହା ଅପ୍ରେଲ ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ର :**

- ❖ ଧାନକୁ ବିହନ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଥିଲେ ବିଲରୁ ମିଶା ଧାନ ଗଛ ଭଲଭାବରେ ବାଛିଦିଅନ୍ତୁ ।
- ❖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଗନ୍ଧିପୋକ ଏବଂ କେଣ୍ଡାକଟା ସଂବାଲୁଆ ଦେଖାଦେଇପାରନ୍ତି । ଗନ୍ଧିପୋକର ଆର୍ଥିକ ଦେହଳୀ ସାମା ହେଲା ବର୍ଗମିଟର ପିଛା ୨-୪ ଟି ପୋକ/ବର୍ଗମିଟର ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଆର୍ଥିକ ଦେହଳୀ ସାମାରୁ ଅଧିକ ହେଲା ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାଟନାଶକଔଷଧ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୫୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

**ଗନ୍ଧିପୋକ**

ଇଥୋଫେନ୍‌ପ୍ରକ୍ୱ ୧୦ EC-୫୦୦ ମି.ଲି./ହେକ୍ଟର କିମ୍ବା

ମାଲାଥ୍‌ଅନ୍ ୫D-୨୫ କି.ଗ୍ରା / ହେକ୍ଟର ଏହି ଗୁଣ୍ଡକୁ ସକାଳେ ପବନ ନଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।

**କେଣ୍ଡା କଟା ସଂବାଲୁଆ**

କୁଇନାଲିଫ୍‌ସ୍ ୨୫ EC ୧୦୦୦ ମି.ଲି./ହେକ୍ଟର କିମ୍ବା କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫ୍‌ସ୍ ୨୦ EC ୧୨୫୦ ମି.ଲି./ହେକ୍ଟର

- ❖ ଯେତେବେଳେ ଶତକଡା ୮୦ ଭାଗ ଧାନ ପାକଳ ହୋଇଯାଇଥିବ ସେହି ସମୟରେ କାଟନ୍ତୁ ନଚେତ୍, ତାଳୁଅ ଧାନରେ ଧାନ ଝଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକା ଥାଏ।
- ❖ ଧାନ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ସୁଖାଇବା ସମୟରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଶତକଡା ୧୪ ଭାଗ ରହିବା ଦରକାରୀ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଖରାରେ ପ୍ରାୟ ୨ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ।
- ❖ ବର୍ଷାଶୁଣ୍ଠ ଖାଲୁଆ ଜମି ଯେଉଁଠାରେ ଧାନ ଛଟାବୁଣା କରାଯାଏ ସେଠାରେ ଖରାଟିଆ ପ୍ରଥମ ଋଷ ପତ୍ରମୋଡା ଲଙ୍ଗଳରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ।

\*\*\*\*\*